

BCGとは	4
Q1. 「BCG」とは、何ですか。何の略ですか。	
作用機序	5
Q2. BCG接種によって結核に対する免疫ができる作用機序について説明してください。	
有効性	6
Q3. BCGワクチンによる結核予防効果について説明してください。	
Q4. BCGワクチンの効果が出てくるのは、接種後どのくらいの期間が過ぎてからでしょうか。	
接種時期	7
Q5. BCG接種はいつまでに行えばいいのでしょうか。	
Q6. 生後3ヵ月以前にBCG接種をしてもかまわないのでしょうか。	
Q7. 生後間もない乳児ですが、海外移住を予定しているため、移住の前にBCG接種を受けておきたいと両親が希望しています。接種をしても差し支えありませんか。	
Q8. 麻疹(はしか)や風疹の予防接種は、母親の移行抗体があるのであまり早い時期に接種できないと聞きますが、BCGワクチンの場合はそのようなことはありませんか。	
Q9. 1歳以上の子どもに対してBCG接種を行うことはできますか。	
Q10. 長期にわたり療養を必要とする疾病で厚生労働省令で定めるものにかかっていた場合、BCG接種を受ける前に、ツベルクリン反応検査をした方がいいですか。	
Q11. 海外から帰国した子どもに対してBCG接種をした方がいいですか。また、接種する前にツベルクリン反応検査をした方がいいですか。	
接種不適合者	11
Q12. BCGワクチンの接種不適合者はどのようなものですか。	
接種要注意者	12
Q13. BCGワクチンの接種要注意者はどのようなものですか。	
Q14. けいれんを起こした子どもに対して、BCG接種を行うことができますか。	
Q15. BCGワクチン及び溶剤にアナフィラキシーの原因となるようなゼラチンや鶏卵由来成分などは含まれていますか。	
Q16. アトピー性皮膚炎の子どもへBCG接種はできますか。	
相互作用	14
Q17. 副腎皮質ホルモン剤を使っていますが、BCG接種を行ってもよいのでしょうか。	
Q18. グロブリン製剤を投与した子どもにBCG接種はできますか。	
Q19. 川崎病は治ってからどのくらいの期間をあけてBCG接種をすればいいですか。	
Q20. 2週間前に麻疹・風疹(MR)の予防接種を受けましたが、今日BCG接種を受けられますか。また、DPT-IPVを受けた場合ではどうですか。	

ウイルス性疾患との関係	16
Q21. BCG接種してから2日後に風疹になりました。ということは、風疹の潜伏期間にBCG接種をしたことになりそうですが大丈夫でしょうか。	
Q22. ウイルス性疾患の治癒後、どのくらい期間を空ければBCG接種ができますか。	
副反応	17
Q23. BCG接種の副反応は、どのようなものがありますか。	
Q24. それぞれの副反応の発生頻度はどのくらいですか。	
Q25. BCG接種後の局所潰瘍の対処法について説明してください。	
Q26. BCG接種して何週も経ったのに、接種局所(針痕)の変化が何も起こりません。針痕がない場合には、接種の効果はあるのですか。	
Q27. 腋窩リンパ節腫大の頻度と対処法について説明してください。	
Q28. 皮膚結核様病変というのは、どのようなものですか。	
Q29. 「骨炎」とはどのようなものですか。	
Q30. 「全身播種性BCG感染症」とはどのようなものですか。	
接種の実際	22
Q31. 腕にBCG接種のあとが残ると嫌なので他の部位に接種したいのですが、適切なところはありませんか。また、BCG接種は左腕にしなければならないのですか。	
Q32. BCGワクチンの懸濁方法について説明してください。	
Q33. 「管針を押すとき、管針をねじらないように注意すること」とありますが、なぜですか。	
Q34. ワクチン液懸濁後の安定性について説明してください。	
Q35. BCG接種後に局所を乾燥させている間に、接種局所に子どもが吐いたミルクがかかってしまいました。拭き取っても問題ありませんか。	
BSEとの関連	25
Q36. BCGワクチンにウシ由来原料を使用していると聞きましたが、BSE(ウシ海綿状脳症)との関連で安全面で心配ありませんか。	
直接接種の導入	26
Q37. 平成17年4月からBCG接種の直接接種が導入されましたが、なぜツ反検査を省略することになったのですか。	
Q38. BCG接種に際して行う予診は直接接種法によって変わりますか。	
Q39. 「コッホ現象」とは、何ですか。	
Q40. BCG接種を受けた翌日、接種部位に強い発赤、腫脹が出ました。どう対応したらよいのでしょうか。	
個別接種	30
Q41. 従来、BCG接種は主に集団接種で行われていましたが、個別接種に移行しても問題ありませんか。	