

ปรากฏการณ์นี้มี
โอกาสเกิดขึ้น
น้อยมาก

ปรากฏการณ์“คอค”คืออะไร?



รอยแผลที่เกิดจากการฉีดวัคซีนบีซีจี จะเกิดขึ้นหลังการฉีดวัคซีนประมาณ 10 วัน แต่โอกาสที่จะเกิดปรากฏการณ์คอคตามตัวอย่างในรูปภาพ มีน้อยมาก



1
接種後
2日

สองวันหลังจากการฉีด
วัคซีนปฏิกิริยาที่
มากกว่าปกติจะเกิดกับ
ผิวหนังจะปรากฏภายใน
สามวัน



2
接種後
5日

ในระยะห้าวันปฏิกิริยาที่
ผิวหนังจะค่อยๆเลือน
หายไป



3
接種後
7日

ในระยะเจ็ดวัน
รอยแผลจะเลือน
หายไปเรื่อยๆ



4
接種後
48日

ในระยะ 48 วัน
รอยแผลจะจาง
หายไปจนเกือบ
หมด

ปรากฏการณ์ “คอค” มีลักษณะเช่นใด? คือการเกิดปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วเฉียบพลันบนบนผิวหนัง
คือเกิดเป็นตุ่มฝีที่อาจมีหนอง หรือไม่มีหนอง เกิดขึ้นภายในสามวันหลังการฉีดวัคซีนและจะหายไปอย่างรวดเร็ว

ควรจะทำอย่างไร หากท่านพบปรากฏการณ์ คอค ในทารกของท่าน?

โปรดปรึกษาแพทย์ที่ฉีดวัคซีนให้ทารกของท่านภายใน 2-3 วัน

มีทางเป็นไปได้ว่าปฏิกิริยาบนผิวหนังที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการที่เด็กของท่านเองเคยได้รับและติดเชื้อวัณโรคก่อนที่จะได้รับการฉีดวัคซีนโดยที่ท่านเองก็ไม่ว่าเด็กติดเชื้อวัณโรคมาได้อย่างไร ท่านควรรับการตรวจว่าทารกติดเชื้อวัณโรคหรือไม่ หากทารกของท่านได้รับวัคซีนบีซีจีในขณะที่มีการตรวจคัดกรองวัณโรค หรือหากท่านไม่สามารถระบุแพทย์ผู้ฉีดวัคซีนได้ ท่านควรไปศูนย์สาธารณสุขใกล้บ้านท่าน ไม่มีความจำเป็นที่ท่านจะต้องไปปรึกษาที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล เพราะโอกาสป่วยเป็นวัณโรคของเด็กในขณะนี้มีน้อยมาก ท่านจึงไม่ต้องกังวล

ตุ่มนูนแดงจะหายไปในช่วงเวลา 2-4 สัปดาห์หลังการฉีดวัคซีน

หากตุ่มฝีแตกและมีหนองไหลออกมาจากผิวหนังตรงตำแหน่งที่ฉีดวัคซีน ไม่จำเป็นต้องปิดแผลด้วยผ้าก๊อศปิดแผล การอักเสบบริเวณดังกล่าวจะหายไปเอง เหลือเป็นรอยแผลเป็น ภายใน 2-4 สัปดาห์หลังการฉีดวัคซีน

ไม่มีอะไร
ต้องวิตกกังวล

